

DANA[!]

NOWOCZESNA GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Japońskie przysłowie mówi, że

*Lustro jest duszą
kobiety, podobnie
jak miecz jest duszą
samuraja.*

Jednak to co w nim można dostrzec
nie zawsze stanowi lustrzane odbicie
rzeczywistości. To co widzimy w lustrze
to wypadkowa naszego wyglądu oraz
podświadomie zinternalizowanego ideału
cielesności i obowiązującego kanonu urody.





NOWOCZESNA GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Ginekologia estetyczna zaspokaja zmieniające się potrzeby kobiet. Poprawiając ich poczucie własnej wartości pozytywnie wpływa na komfort psychiczny, jakość życia płciowego oraz więzi pomiędzy partnerami. Dyskomfort mogą wywoływać defekty wrodzone, nabyte po porodzie oraz te, których pojawianie się związane jest z wiekiem biologicznym. W wielu przypadkach eliminacja dyskomfortu konieczna jest nie tylko ze względów estetyczno-psychicznych, ale i medycznych.

METODY LECZENIA

Przeprowadzane dotychczas inwazyjne procedury medyczne przywracające pierwotny wygląd i estetykę okolic intymnych wykorzystywały inwazyjne metody leczenia, które niejednokrotnie wiązały się z wystąpieniem komplikacji pooperacyjnych. Zastosowanie lasera S-CO2 DANA do rewitalizacji okolic intymnych nie daje tego typu skutków ubocznych. Metoda ta jest bezpieczna i bezinwazyjna.

Firma DANA to renomowana marka na rynku urządzeń medycznych. Opracowywane we współpracy z najlepszymi specjalistami z różnych specjalizacji medycznych urządzenia, cechuje wysoka jakość, innowacyjna funkcjonalność, niezawodność oraz nowoczesna estetyka.

UDANE ŻYCIE SEKSUALNE

Udane współżycie seksualne cementuje związek dwojga ludzi i sprawia, że czujemy się zdrowsi, atrakcyjniejsi i młodszy. Wiąż seksualna jest jedną z ważniejszych, prócz więzi uczuciowej czy charakterologicznej, form więzi partnerskiej. Aktywność seksualna jest bowiem doskonałym sposobem na pogłębienie związku między dwojgiem ludzi. By życie intymne było udane w pierwszej kolejności musimy nauczyć się cieszyć własnym ciałem co w wielu przypadkach wywołuje konieczność eliminacji drobnych defektów natury anatomiczno-fizjologicznej. Niektóre defekty istnieją od urodzenia, inne wywołane są menopauzą i starzeniem organizmu czy przebytymi porodami. Zachodzące zmiany nie tylko utrudniają kontakty intymne i zmniejszają poziom satysfakcji seksualnej, ale często mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie, tak jak jest to w przypadku wystąpienia objawów nietrzymania moczu.

PRZEBIEG ZABIEGU

Pacjentka jest kwalifikowana do zabiegu po konsultacji lekarskiej u lekarza ginekologa oraz na podstawie aktualnego wyniku badania cytologicznego. Zabieg nie wymaga znieczulenia, rekonwalescencji oraz hospitalizacji

Laser S-CO2 DANA wyposażony jest w specjalną głowicę ze skanerem. Głowica ta jest wprowadzana do pochwy. Jej działanie polega na generowaniu fototermicznej stymulacji fibroblastów do produkcji nowych włókien kolagenowych. W efekcie końcowym dochodzi do zwiększenia napięcia i elastyczności tkanek podanych zabiegowi oraz zmniejszenia obwodu pochwy, a także redukcji objawów nietrzymania moczu. Po około miesiącu pojawiają się widoczne efekty zabiegu – pochwa staje się ujędrniona i bardziej nawilżona.

ROZWIĄZANIE

Zabiegi rewitalizacji pochwy oraz korekty budowy anatomicznej wykonywane za pomocą lasera S-CO2 DANA.

Ta nieinwazyjna, niechirurgiczna, bezpieczna i bezbolesna procedura medyczna prowadzi do obkurczenia i odbudowy błony śluzowej pochwy, zmniejszenia obwodu pochwy oraz wzrostu jej elastyczności i nawilżenia. Zabieg ten znacznie poprawia samopoczucie, jakość i komfort życia seksualnego obu partnerów oraz niweluje niedogodności związane, na przykład z uprawianiem sportu, częstymi zakażeniami okolic intymnych czy nietrzymaniem moczu.



MENOPAUZA

Menopauza to szczególny rozdział, który zapisuje się na kartach kobiecości. Seksualność kobiety przybiera wówczas nieco inne oblicze. Merytoryczne przygotowanie, wsparcie i pozytywne nastawienie psychiczne do rezultatów jakie może przynieść zastosowanie nieinwazyjnych procedur ginekologii estetycznej przynosi wspaniałe rezultaty, które przywracają dawną intensywność doznań erotycznych.

CZYM JEST MENOPAUZA?

Menopauza to etap pomiędzy wiekiem prokreacyjnym a starzeniem, który powoduje zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, jajnikach oraz wywołuje zaburzenia enzymatycznej biosyntezy i metabolizmu hormonów steroidowych. Objawy kliniczne w drugim okresie są tym silniejsze im niższy poziom estrogenów. Zalicza się do nich m.in. suchość pochwy, dyspareunię, zanikowe zapalenie pochwy, nawracające infekcje dróg moczowych, zaburzenia statyki narządów płciowych, nietrzymanie moczu, podrażnienia objawiające się pieczeniem i swędzeniem. Już w okresie okołomenopauzalnym dochodzi do obniżenia aktywności i syntezy fibroblastów błony śluzowej pochwy. W efekcie spada poziom produkcji kolagenu, a tym samym obniża się elastyczność pochwy. Zmniejszająca się liczba i aktywność gruczołów śluzowych powoduje jej suchość. Wiele kobiet

przechodzących menopauzę skarży się na uderzenia krwi do głowy, zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca w nadbrzuszu, palpacje, nadmierne pocenie się, bóle i zawroty głowy, dużą labilność emocjonalną, depresję, bezsenność, osłabienie koncentracji i pamięci. Wszystko to znacznie obniża satysfakcję lub stanowi znaczącą barierę dla udanego współżycia seksualnego.

PRZEBIEG ZABIEGU

Pacjentka jest kwalifikowana do zabiegu po konsultacji lekarskiej u lekarza ginekologa oraz na podstawie aktualnego wyniku badania cytologicznego. Zabieg nie wymaga znieczulenia, rekonwalescencji oraz hospitalizacji. Laser S-CO2 DANA wyposażony jest w specjalną głowicę ze skanerem. Głowica ta jest wprowadzana do pochwy. Jej działanie polega na generowaniu fototermicznej stymulacji fibroblastów do produkcji nowych włókien kolagenowych.

W efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia napięcia i elastyczności tkanek podanych zabiegowi oraz zmniejszenia obwodu pochwy, a także redukcji objawów nietrzymania moczu. Po około miesiącu pojawiają się widoczne efekty zabiegu – pochwa staje się ujędrniona i bardziej nawilżona.

ROZWIĄZANIE

Zabiegi rewitalizacji pochwy oraz korekty budowy anatomicznej wykonywane za pomocą lasera S-CO2 DANA. Ta nieinwazyjna, niechirurgiczna, bezpieczna i bezbolesna procedura medyczna prowadzi do obkurczenia i odbudowy błony śluzowej pochwy, zmniejszenia obwodu pochwy oraz wzrostu jej elastyczności i nawilżenia. Zabieg ten znacznie poprawia samopoczucie, jakość i komfort życia seksualnego obu partnerów oraz niweluje niedogodności związane, na przykład z uprawianiem sportu, częstymi zakażeniami okolic intymnych czy nietrzymaniem moczu.



NIETRZYMANIE MOCZU

Nietrzymanie moczu to powszechny problem społeczny. Ostatnie badania wskazują, iż częstość występowania NTM wśród kobiet około 20. roku życia jest na poziomie 10%, a na tę przypadłość cierpi około 39% kobiet w wieku ponad 70 lat. Częstość występowania codziennych incydentów nietrzymania moczu wynosi od 5% do 15% (wzrost do ponad 15% u kobiet powyżej 70. roku życia). Ta wstydliwa choroba to w dużej mierze przypadków skutek wahań hormonalnych jakich doświadczają kobiety w trakcie ciąży, porodu czy procesu starzenia, w tym klimakterium.

CO POWODUJE BRAK LECZENIA?

Nie leczone nietrzymanie moczu prowadzi do znacznego ograniczenia komfortu życia z powodu nieprzyjemnego zapachu związanego z wyciekającym moczem oraz występowania powikłań takich jak: zapalenie układu moczowego, zapalenie dróg rodnych oraz wyprysków skóry kroczka.

PRZEBIEG ZABIEGU

Pacjentka jest kwalifikowana do zabiegu po konsultacji lekarskiej u lekarza ginekologa oraz na podstawie aktualnego wyniku badania cytologicznego. Zabieg nie wymaga znieczulenia, rekonwalescencji oraz hospitalizacji.

Leczenie atrofii pochwy i wysiłkowego nietrzymania moczu, z wykorzystaniem lasera S-CO2 DANA to bezpieczny, pozwalający na pełną kontrolę zabieg. Podczas zabiegu do wnętrza

pochwy za pomocą prowadnicy wprowadzana jest specjalna głowica, wyposażona w skaner, która w sposób kontrolowany wykonuje szereg kolumn ablacyjnych, doprowadzając do punktowych uszkodzeń błony. Stymuluje to fibroblasty do odbudowy włókien kolagenowych, a w efekcie końcowym prowadzi do regeneracji śluzówki pochwy oraz okolic cewki moczowej. Po około miesiącu pojawiają się widoczne efekty zabiegu – pochwa staje się ujędrniona i bardziej nawilżona.

ROZWIĄZANIE

Nieinwazyjna, niechirurgiczna, bezpieczna i bezbolesna procedura medyczna z wykorzystaniem lasera S-CO2 DANA prowadzi do zmniejszenia wiotkości śluzówki pochwy, zwiększenia napięcia tkanek, podwyższenia elastyczności i stopień nawilżenia błony śluzowej pochwy, eliminuje objawy zespołu rozluźnienia pochwy oraz nietrzymania moczu.



PLASTYKA WARG SROMOWYCH

Estetyka zewnętrznych narządów płciowych ma ogromne znaczenie dla samooceny każdej kobiety co istotnie wpływa na poziom satysfakcji płynącej z udanego pożycia intymnego. Zabiegi wykonywane laserem S-CO2 DANA, w tym labioplastyka umożliwia modelowanie wielkości i kształtu warg sromowych.

Ciąża to niezwykle okres w życiu każdej kobiety, jednak zwiększona produkcja hormonów żeńskich może pozostawić ślady nie tylko w postaci przyrostu masy ciała czy rozstępów skórnych. W trakcie porodu dojść może do zmian w obrębie krocza i pochwy, w tym do deformacji warg sromowych. Ich przerost może być spowodowany znacznym przyrostem masy ciała lub wynika z uwarunkowań genetycznych. Deformacje i asymetryczność warg sromowych mogą być również spowodowane naturalnym procesem starzenia organizmu. Niezadowolenie z kształtu i rozmiaru warg sromowych jest często przyczyną zaburzeń seksualnych. Nieprawidłowości wynikające ze złej anatomii tego narządu nie tylko wpływają na stan psychiczny, ale także mogą być przyczyną dolegliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem (noszenie bielizny, stroju kąpielowego), jak również uprawianiem niektórych sportów np. jazda konna, jazda na rowerze.

PRZEBIEG ZABIEGU

Pacjentka jest kwalifikowana do zabiegu po konsultacji lekarskiej u lekarza ginekologa dotyczącej stanu zdrowia pacjentki oraz jej historii chorobowej. W przypadku utraty

jędrności warg sromowych wykonuje się zabieg z wykorzystaniem skanera frakcyjnego. Jego działanie polega na skracaniu włókien kolagenowych oraz stymulacji produkcji nowych włókien kolagenu i elastyny. W wyniku przeprowadzonego zabiegu, tkanka skórna jest zagęszczona i ujędrniona. Przebieg zabiegu jest taki sam jak w przypadku leczenia nietrzymania moczu, jednak tutaj działamy w obszarze zewnętrznym.

Labioplastyka z wykorzystaniem lasera S-CO2 DANA zalecana jest u pacjentek z deformacją, hipertrofią lub asymetrią warg sromowych. Stymulując neokolagenozę, wiązka laserowa zwiększa gęstość i elastyczność tkanek, a także modeluje ich kształt. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a okres rehabilitacji trwa do 1 miesiąca.

ROZWIĄZANIE

Bezpieczne i precyzyjne procedury medyczne z wykorzystaniem lasera S-CO2 DANA pozwalają na przeprowadzenie korekty wielkości, kształtu i estetyki warg sromowych, tym samym zwiększając komfort sfery psychicznej i fizycznej pacjentki pozytywnie wpływa na jej kontakty intymne oraz jakość życia codziennego.



REDUKCJA BLIZN

Zabieg polecany jest w przypadku blizn powstałych w wyniku porodu.

Blizny po cięciu cesarskim, mają charakter guzowaty, są wypukłe ponad poziom skóry z odmienioną kolorystyką, jednak zazwyczaj nie wpływają na estetykę ciała ponieważ są ukryte pod bielizną. Zdarzają się jednak zabiegi cięcia cesarskiego wywołane wcześniejszymi operacjami tzw. cięciem prostym, skutkiem którego jest blizna prosta biegnąca od pępka do spojenia łonowego, wówczas taka blizna jest widoczna i może wpływać na samopoczucie estetyczne pacjentki.

Blizny po nacięciu krocza powstają na skutek niekontrolowanego rozerwania krocza lub przewencyjnego jego nacięcia przez lekarza podczas porodu metodą naturalną. Żle zszyta rana jest powodem jej nieprawidłowego gojenia, w wyniku czego powstaje bolesna, ciągnąca blizna, zrosty i stwardnienia. Niedokładne zszywanie może skutkować luźnością pochwy i wpływać na jakość życia seksualnego kobiety i jej partnera.

PRZEBIEG ZABIEGU

Pacjentka jest kwalifikowana do zabiegu po konsultacji lekarskiej u lekarza ginekologa. Lekarz za pomocą lasera S-CO2 Dana wyposażonego w specjalny skaner frakcjonujący, wykonuje dziesiątki nakłuć ablacyjnych na bliźnie oraz w jej okolicach. Laser S-CO2 DANA nakłuwając blizny dodatkowo je podgrzewa powodując uruchomienie procesów przebudowy

włókien kolagenowych i elastyny. Zabieg trwa około 5 minut i jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Obszar poddany zabiegowi jest zaczerwieniony z lekkim obrzękiem utrzymującym się kilka godzin. Mogą również pojawić się mikroskopijne strupki, które zazwyczaj ulegają złuszczeniu do siedmiu dni. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując od 3 do 6 zabiegów, jednak zawsze ilość zabiegów uwarunkowana jest rodzajem blizny jej wielkością oraz wiekiem.

ROZWIĄZANIE

Blizny po cięciu cesarskim oraz po nacięciu krocza poddane zabiegowi laserem S-CO2 DANA, zostają przebudowane. W efekcie końcowym, blizna zostaje zrównana z powierzchnią skóry, a jej pierwotny koloryt odzyskany. Jednak najważniejszy efekt dla pacjentki to taki, w którym blizna odzyskuje jędrność i elastyczność, likwidując tym samym efekt ściągania i napięcia.





ZOBACZ WIĘCEJ NA: **WWW.MSH.COM.PL**
